

Exploitation :

saint leger

Parcelle :

pièce de derrière


Type de sol :

limon profond

Commentaires :


  


Adventices étudiées :



## Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	65000 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Arroche 99	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d3	Ray-grass 13
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 13	Arroche 88
Arroche 0	Arroche -1	Arroche -10	Arroche 88	Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 17	

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Déc-d1	Ray-grass 19
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Arroche 3
Arroche -2	Arroche -1	Arroche 0		Vulpin 19
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		