

Scénario : rotation  
 Exploitation : saint leger  
 Parcelle : pièce de derrière  
 Type de sol : limon profond

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	4 ( 12 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d1  Ray-grass 18	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Oct-d1 Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -6	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  400 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass -2
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Déc-d1  Ray-grass -2	Désherbage chimique  Jan-d2	Score annuel  Ray-grass 1

#### Année 2 - Tournesol

Date de semis  Avr-d2  Ray-grass 19	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1  Ray-grass -3	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  65000 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass 0	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2  Ray-grass -2	Désherbage chimique  Mai-d3	Score annuel  Ray-grass 13

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d2  Ray-grass 7	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -12	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  400 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass -2
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Déc-d1	Score annuel  Ray-grass 0

### Année 4 - Betteraves

Date de semis  Jan-d1  Ray-grass 1	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Mar-d2 Jan-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2  Ray-grass -2	Date de labour  Mar-d3  Ray-grass -4	Densité de semis  90000 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  45 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Mai-d2 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass -2	Désherbage chimique  Avr-d3	Score annuel  Ray-grass 0

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d2  Ray-grass 7	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6	Interculture  Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -12	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  400 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass -2
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Nov-d2  Ray-grass -1	Désherbage chimique  Jan-d2	Score annuel  Ray-grass 0

### Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2 Ray-grass 4	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Date des faux semis : Déc-d2 Jan-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass 0	Jan-d1 Ray-grass -3	300 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0

### Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Ray-grass 7	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -12	Pas de labour Ray-grass 0	400 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass -2
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Nov-d2 Ray-grass -1	Désherbage chimique Jan-d2	Score annuel Ray-grass 0

### Année 8 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Ray-grass 12	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Date des faux semis : Mar-d2 Fév-d2 Jan-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass -2	Avr-d1 Ray-grass -4	5500000 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Ray-grass 6

### Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d2  Ray-grass 7	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -12	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  400 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass -2
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Nov-d2  Ray-grass -1	Désherbage chimique  Jan-d2	Score annuel  Ray-grass 0

### Année 10 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d1  Ray-grass 73	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6	Interculture  Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -1	Date de labour  Aoû-d2  Ray-grass -5	Densité de semis  300000 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  45 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Oct-d2 Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass -9	Désherbage chimique  Fév-d1	Score annuel  Ray-grass 53