

Exploitation : Unilasalle
Parcelle : Larris
Type de sol : limono-argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	6	
Folle-avoine	1	
Ray-grass	2	
Vulpin	0	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	0.38 gr/m²
Coquelicot 7	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 9	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 1	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Août-d2 Sep-d2 Sep-d1	
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 2 - Blé de printemps

Date de semis

Jun-d3

Coquelicot7

Folle-avoine0

Ray-grass9

Vulpin1

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Densité de semis

250 gr/m²

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Entre rangs

17 cm

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot-1

Folle-avoine-1

Ray-grass-1

Vulpin-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Sep-d1Aoû-d3
Aoû-d2Aoû-d1
Herse étrille :

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Désherbage chimique

Nov-d1Sep-d2

Score annuel

Coquelicot6

Folle-avoine0

Ray-grass8

Vulpin0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis

Jun-d3

Coquelicot7

Folle-avoine0

Ray-grass9

Vulpin1

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Coquelicot-10

Folle-avoine-10

Ray-grass-10

Vulpin-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Densité de semis

301.05 gr/m²

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Entre rangs

20 cm

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot-1

Folle-avoine-1

Ray-grass-1

Vulpin-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Sep-d1Août-d3
Août-d2Août-d1
Herse étrille :

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Désherbage chimique

Sep-d3

Score annuel

Coquelicot0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Vulpin0

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.95 gr/m²
Coquelicot 11	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Fév-d1 Jan-d3 Jan-d2 Herse étrille :	Nov-d1 Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 9
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 9
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 0

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m²
Coquelicot 7	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Ray-grass 9	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Aoû-d3 Houe rotative : Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d2 Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 4
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Jun-d3

Coquelicot	7
Folle-avoine	0
Ray-grass	9
Vulpin	1

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Coquelicot	-10
Folle-avoine	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Densité de semis

Non défini

Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Entre rangs

17 cm

Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Variété

Moyennement couvrante

Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Ray-grass	-1
Vulpin	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :

Sep-d2

Sep-d1

Aoû-d3

Aoû-d2

Herse étrille :

Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0