

Exploitation : B Hue
 Parcelle : Oisillière
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass | 45 |
| Chénopode | 18 |
| Matricaire | 47 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|----------------------|
| Aoû-d2 | Association de cultures : Féverole d'hiver Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 27 gr/m ² |
| Ray-grass 88 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 34 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 78 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Chénopode 24 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Matricaire 20 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 200 gr/m ² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 48 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 7 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 25 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d2 | Pas de labour | 250 gr/m ² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 48 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 7 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 25 |

Année 4 - Féverole d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|--|--|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 40 gr/m ² |
| Ray-grass 15 Chénopode 0 Matricaire 17 | Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 | Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 | Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 | Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 |
| Entre rangs 17 cm | Variété Non couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel |
| Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 | Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 | Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 | | Ray-grass 15 Chénopode 0 Matricaire 17 |