

Exploitation : Frieh
 Parcelle : TD parcelle Laris
 Type de sol : Limon argileux(silex)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	54
Vulpin	49

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d1 Ray-grass 73 Vulpin 43	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	103 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Entre rangs 35 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d2	Ray-grass 65 Vulpin 35	

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1 Ray-grass 69 Vulpin 87	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	 Sep-d3 Nov-d1	Ray-grass 62 Vulpin 80	

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d2	Ray-grass 55 Vulpin 72
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d3	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d3 Avr-d2 Mar-d2 Jun-d1	Ray-grass 13 Vulpin 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 111	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1 Nov-d2 Sep-d3	Ray-grass 89 Vulpin 104
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		