

Exploitation : GEAC de mamie la chacal
Parcelle : Le bas mounouf
Type de sol : limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	34
Renouée des oiseaux	31
Vulpin	35
Véronique FDL	55

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Août-d2	Pas de labour	171 gr/m²
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 100	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 27	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Jan-d3 Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1 Août-d3 Août-d2	Ray-grass 71
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Vulpin 91
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Véronique FDL 18
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Véronique FDL 80</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Véronique FDL -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Véronique FDL -1</p>	<p>250 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique FDL -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Sep-d2 Nov-d1</p>	<p>Ray-grass 23</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 23</p> <p>Véronique FDL 70</p>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Ray-grass 66</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 83</p> <p>Véronique FDL 43</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Véronique FDL -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3</p> <p>Date de destruction : Jul-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>301.05 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique FDL -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Oct-d2 Sep-d3</p>	<p>Ray-grass 57</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Vulpin 74</p> <p>Véronique FDL 34</p>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Renouée des oiseaux 110 Vulpin 21 Véronique FDL 14	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6 Véronique FDL -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Sep-d1 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0	Pas de labour Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0	7.9 gr/m² Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 80 cm Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1 Véronique FDL -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1 Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -3 Renouée des oiseaux -14 Vulpin -3 Véronique FDL -2	Désherbage chimique Mar-d2 Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1 Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2	Score annuel Ray-grass 10 Renouée des oiseaux 89 Vulpin 12 Véronique FDL 5

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 35 Renouée des oiseaux 9 Vulpin 35 Véronique FDL 80	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6 Véronique FDL -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Sep-d3 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0	Pas de labour Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0	234 gr/m² Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Vulpin -2 Véronique FDL -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1 Véronique FDL -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0	Désherbage chimique Oct-d3 Oct-d2 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1 Nov-d2	Score annuel Ray-grass 26 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 26 Véronique FDL 71