

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Maïs Blé Blé
SCEA Moncey
1
Argiles noires

Commentaires :

Terres profondes en bord de Loire avec possibilité d'irriguer

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16 (24)
Gaillet	46 (36)
Vulpin	17 (23)
Renouée persicaire	42 (65)
Datura stramoine	14 (20)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Gaillet 2 Vulpin 21 Renouée persicaire 136 Datura stramoine 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 Ray-grass -6 Gaillet -0 Vulpin -4 Renouée persicaire -4 Datura stramoine -2	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 9 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 80 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Ray-grass -3 Gaillet -0 Vulpin -3 Renouée persicaire -19 Datura stramoine -2	Désherbage chimique Avr-d3 Mai-d2	Score annuel Ray-grass 11 Gaillet 2 Vulpin 14 Renouée persicaire 113 Datura stramoine 32

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Mar-d1 Nov-d1 Nov-d2	
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 69
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 2
Renouée persicaire -0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	290 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 91
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 49
Renouée persicaire -0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0

