

Exploitation :

BENOIST

Parcelle :

LE_BOUT_DU_CHAMP

Type de sol :

Argiles à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Gaillet | 11 |
| Vulpin | 27 |
| Ray-grass | 30 |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---------------|---|--|----------------------------|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Sep-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini | Pas de labour | 200 gr/m ² |
| Gaillet 45 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 107 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 101 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 Oct-d1 Sep-d1 | Gaillet 38 Vulpin 100 Ray-grass 94 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |

Année 2 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 280 gr/m ² |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d3 Sep-d3 Sep-d1 Déc-d2 | Gaillet 0 Vulpin 1 Ray-grass 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -2 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass -2 | | |

Année 3 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Jan-d2 | 4 gr/m ² |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -11 | Gaillet 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 75 cm | Très couvrante | Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Jun-d3 Jun-d1 Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3 | Gaillet 0 Vulpin 8 Ray-grass 10 |
| Gaillet 0 | Gaillet -2 | Gaillet -0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin -2 | Vulpin -2 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|--------------------------------|---|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 280 gr/m ² |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d2 Nov-d3 Oct-d2 Sep-d3 | Gaillet 88 Vulpin 80 Ray-grass 62 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |

Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|--|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 380 gr/m ² |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 | Gaillet 2 Vulpin 21 Ray-grass 19 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Jan-d2 | 115 gr/m ² |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -11 | Gaillet 0 |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 50 cm | Très couvrante | Bineuse : Mai-d3 | Avr-d2 Mar-d3 | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -2 | Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 27 |
| Vulpin 0 | Vulpin -2 | Gaillet 0 | | Ray-grass 26 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Vulpin 0 | | |
| | | Ray-grass 0 | | |