

Exploitation : h  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Ray-grass	24
Coquelicot	50
Brome mou	25
Matricaire	45

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>			<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Pas de labour</span>	
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d2</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d1</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Non définie</span>	Vulpin 0	30 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Vulpin -1 Ray-grass -5 Coquelicot -1 Brome mou -3 Matricaire -3	Ray-grass 0	Vulpin 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6		Coquelicot 0	Ray-grass 0
Brome mou 105	Brome mou -6		Brome mou 0	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire -6		Matricaire 0	Brome mou 0
<b>Entre rangs</b>				
13 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Vulpin -2	Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d1</span>	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d1</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Sep-d1</span>	Vulpin 75
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Vulpin -4 Ray-grass -5 Coquelicot -2 Brome mou -4 Matricaire -1		Ray-grass 77
Coquelicot -2	Coquelicot -1			Coquelicot 30
Brome mou -2	Brome mou -1			Brome mou 89
Matricaire -2	Matricaire -1			Matricaire 17

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 8 Ray-grass 10 Coquelicot 35 Brome mou 19 Matricaire 13
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -5		
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou -4		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 108	Brome mou -10	Brome mou -8	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Sep-d3	Oct-d3	Vulpin 68 Ray-grass 49 Coquelicot 43 Brome mou 77 Matricaire 9
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -11		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -9		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -6		
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou -10		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -3		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	30 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d3	Mai-d2	Vulpin 15 Ray-grass 14 Coquelicot 30 Brome mou 6 Matricaire 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Sep-d1	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 8 Ray-grass 10 Coquelicot 35 Brome mou 19 Matricaire 13
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -5		
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou -4		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Fév-d2</b> Vulpin 24 Ray-grass 21 Coquelicot 32 Brome mou 8 Matricaire 42	<b>Association de cultures :</b> Aucune <b>Fort</b> Vulpin -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Brome mou -10 Matricaire -10	<b>Date des faux semis :</b> <b>Fév-d2</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Aoû-d2</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Fév-d1</b> Vulpin -1 Ray-grass -0 Coquelicot -1 Brome mou -1 Matricaire -2	<b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0 Matricaire 0	<b>250 gr/m<sup>2</sup></b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 13 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2 Brome mou -2 Matricaire -2	<b>Variété</b> <b>Moyennement couvrante</b> Vulpin -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1 Brome mou -1 Matricaire -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Mar-d1</b> <b>Fév-d3</b> Vulpin -2 Ray-grass -2 Coquelicot -3 Brome mou -2 Matricaire -4	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mar-d2</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 9 Ray-grass 6 Coquelicot 16 Brome mou 0 Matricaire 23