

Exploitation : Lebleu  
 Parcelle : derrière ferme  
 Type de sol : Argilo-limoneux

### Commentaires :

Essai pour 2A

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31
Ray-grass	33
Brome mou	26
Matricaire	69
Coquelicot	68

### Situation initiale :

#### Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1			Mar-d1	25 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome mou 16	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou -4	Brome mou 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2	Mar-d1	Vulpin 29
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Herse étrille :		Ray-grass 27
Brome mou 0	Brome mou 0	Vulpin -2		Brome mou 9
Matricaire 0	Matricaire 0	Ray-grass -2		Matricaire 43
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Brome mou -1		Coquelicot 42
		Matricaire -2		
		Coquelicot -3		

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 115	Brome mou -10	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 53	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 92 Ray-grass 85 Brome mou 103 Matricaire 16 Coquelicot 41
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 41	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 28 Ray-grass 26 Brome mou 9 Matricaire 44 Coquelicot 39
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 30 Ray-grass 28 Brome mou 39 Matricaire 20 Coquelicot 50
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	110 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3	Vulpin 27 Ray-grass 25 Brome mou 12 Matricaire 43 Coquelicot 43
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 30 Ray-grass 28 Brome mou 39 Matricaire 20 Coquelicot 50
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou -7	Brome mou -6	Brome mou 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 31 Ray-grass 26 Brome mou 45 Matricaire 8 Coquelicot 42
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		