






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

gaec lb
7
argilo-limoneux

Commentaires :

très mauvaise terre

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Coquelicot | 70  |
| Gaillet | 28  |
| Vulpin | 39  |
| Ray-grass | 40  |
| Chénopode | 43  |

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|---|--|
| <p>Avr-d2</p> <p>Coquelicot 38</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Chénopode 63</p> | <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Date des faux semis : Mar-d2 Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Chénopode -4</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>36 gr/m²</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>90 cm</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Moyennement couvrante</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Chénopode -1</p> | <p>Bineuse : Mai-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -0</p> <p>Chénopode -3</p> | <p>Mai-d2 Avr-d2 Jul-d2 Jun-d2</p> | <p>Coquelicot 33</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Vulpin 18</p> <p>Ray-grass 15</p> <p>Chénopode 54</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|-------------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d1 | 400 gr/m² |
| Coquelicot 71 | Coquelicot -4 | Coquelicot -4 | Coquelicot -3 | Coquelicot -2 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet -7 | Gaillet -2 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin -9 | Vulpin -2 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass -6 | Ray-grass -2 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Jun-d2 Avr-d2 | |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot -3 | | Coquelicot 54 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | | Gaillet 71 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Vulpin 63 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | | Ray-grass 47 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 3 |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Fév-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Coquelicot 50 | Coquelicot -10 | Coquelicot -1 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -10 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 38 | Vulpin -10 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -10 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode -10 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Jun-d2 | |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot -3 | | Coquelicot 34 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Gaillet 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Vulpin 24 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | | Ray-grass 19 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Chénopode 46 |

Année 4 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|-------------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 80 gr/m² |
| Coquelicot 66 | Coquelicot 0 | Coquelicot -4 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Gaillet 92 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Vulpin 83 | Vulpin 0 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 66 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 9 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 Déc-d1 Mai-d2 | Coquelicot 59 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot -3 | | Gaillet 84 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | | Vulpin 75 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Ray-grass 57 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | | Chénopode 7 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|-------------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d1 | 350 gr/m² |
| Coquelicot 71 | Coquelicot -4 | Coquelicot -4 | Coquelicot -3 | Coquelicot 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 Avr-d2 Déc-d1 | Coquelicot 56 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot -3 | | Gaillet 73 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | | Vulpin 65 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Ray-grass 49 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | | Chénopode 5 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 6 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|---|---|
| <p>Août-d1</p> <p>Coquelicot 19</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Vulpin 43</p> <p>Ray-grass 73</p> <p>Chénopode 35</p> | <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Chénopode -6</p> | <p>Date des faux semis : Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Coquelicot -0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>180 gr/m²</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>12.5 cm</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Très couvrante</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Bineuse : Nov-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Fév-d2 Oct-d1 Avr-d2</p> | <p>Coquelicot 6</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 32</p> <p>Ray-grass 59</p> <p>Chénopode 23</p> |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|---|---|
| <p>Oct-d1</p> <p>Coquelicot 71</p> <p>Gaillet 95</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Chénopode 15</p> | <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Chénopode -4</p> | <p>Date des faux semis : Oct-d1 Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Chénopode -3</p> | <p>Oct-d1</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Gaillet -7</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Chénopode -1</p> | <p>350 gr/m²</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>12.5 cm</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Bineuse : Nov-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Déc-d1 Mai-d2 Fév-d2</p> | <p>Coquelicot 56</p> <p>Gaillet 73</p> <p>Vulpin 65</p> <p>Ray-grass 49</p> <p>Chénopode 5</p> |