

Exploitation : Chéron
 Parcelle : 8
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Mouron | 21 |
| Chénopode | 33 |
| Mercuriale | 13 |
| Ray-grass | 38 |
| Vulpin | 31 |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Oct-d3 | 350 gr/m ² |
| Mouron 2 Chénopode 8 Mercuriale 18 Ray-grass 35 Vulpin 35 | Mouron -4 Chénopode -4 Mercuriale -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 | Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Mouron -1 Chénopode -1 Mercuriale -2 Ray-grass -5 Vulpin -7 | Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Mouron 0 Chénopode 2 Mercuriale 10 Ray-grass 25 Vulpin 23 |
| Mouron -1 Chénopode -1 Mercuriale -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 | Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | | |

Année 2 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|--|
| Aoû-d3 | | Aoû-d2 50% | Aoû-d3 | 12 gr/m ² |
| Mouron | 9 | Mouron | -1 | Mouron |
| Chénopode | 31 | Chénopode | -2 | Chénopode |
| Mercuriale | 10 | Mercuriale | 0 | Mercuriale |
| Ray-grass | 96 | Ray-grass | -3 | Ray-grass |
| Vulpin | 89 | Vulpin | -1 | Vulpin |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Mouron | -2 | Mouron | 0 | Mouron |
| Chénopode | -2 | Chénopode | 0 | Chénopode |
| Mercuriale | -2 | Mercuriale | 0 | Mercuriale |
| Ray-grass | -2 | Ray-grass | 0 | Ray-grass |
| Vulpin | -2 | Vulpin | 0 | Vulpin |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|--|
| Oct-d3 | | Sep-d2 50% Oct-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Mouron | 2 | Mouron | -0 | Mouron |
| Chénopode | 8 | Chénopode | -2 | Chénopode |
| Mercuriale | 18 | Mercuriale | -2 | Mercuriale |
| Ray-grass | 35 | Ray-grass | -10 | Ray-grass |
| Vulpin | 35 | Vulpin | -11 | Vulpin |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Mouron | -1 | Mouron | 0 | Mouron |
| Chénopode | -1 | Chénopode | 0 | Chénopode |
| Mercuriale | -1 | Mercuriale | 0 | Mercuriale |
| Ray-grass | -1 | Ray-grass | 0 | Ray-grass |
| Vulpin | -1 | Vulpin | 0 | Vulpin |

Année 4 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Aoû-d2 50% | Jan-d1 | 12 gr/m ² |
| Mouron | 70 | Mouron -2 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Chénopode | 66 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Mercuriale | 50 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Ray-grass | 33 | Ray-grass -8 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin | 35 | Vulpin -5 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 42 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Mouron | 0 | Mouron : Bineuse : Avr-d3 Avr-d2 Mai-d2 Jun-d1 Mai-d1 | | Mouron 45 |
| Chénopode | 0 | Chénopode : Houe rotative : Herse étrille : Mouron -22 | | Chénopode 47 |
| Mercuriale | 0 | Mercuriale -23 | | Mercuriale 25 |
| Ray-grass | 0 | Ray-grass -4 | | Ray-grass 18 |
| Vulpin | 0 | Vulpin -4 | | Vulpin 21 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Mouron 0 | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Mouron | 2 | Chénopode 0 | Mouron 0 | Mouron 0 |
| Chénopode | 8 | Mercuriale 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Mercuriale | 18 | Ray-grass 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Ray-grass | 35 | Vulpin 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin | 35 | | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 15 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Mouron | -1 | Mouron : Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 | | Mouron 0 |
| Chénopode | -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 3 |
| Mercuriale | -1 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 13 |
| Ray-grass | -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 30 |
| Vulpin | -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 30 |

Année 6 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|--|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Mouron | 9 | Mouron | -1 | Mouron |
| Chénopode | 31 | Chénopode | -2 | Chénopode |
| Mercuriale | 10 | Mercuriale | 0 | Mercuriale |
| Ray-grass | 96 | Ray-grass | -3 | Ray-grass |
| Vulpin | 89 | Vulpin | -1 | Vulpin |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Sep-d2 Oct-d2 | | |
| Mouron | 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Chénopode | 0 | Mouron | -0 | Mouron |
| Mercuriale | 0 | Chénopode | -2 | Chénopode |
| Ray-grass | 0 | Mercuriale | -2 | Mercuriale |
| Vulpin | 0 | Ray-grass | -9 | Ray-grass |
| | | Vulpin | -10 | Vulpin |