

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme unilasalle
TD 8
Argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	21	
Gaillet	39	
Vulpin	42	
Matricaire	47	
Ray-grass	40	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Juil-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	53 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Sep-d2	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 19
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 18
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 79
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 83

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode11</div> <div>Gaillet97</div> <div>Vulpin60</div> <div>Matricaire29</div> <div>Ray-grass52</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode-4</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Vulpin-4</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Ray-grass-4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> <div>Aoû-d3</div> <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode-5</div> <div>Gaillet-1</div> <div>Vulpin-8</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Ray-grass-11</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	Densité de semis 270 gr/m² <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Vulpin-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Ray-grass-2</div>	Variété Très couvrante <div>Chénopode-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Vulpin-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Ray-grass-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet88</div> <div>Vulpin44</div> <div>Matricaire17</div> <div>Ray-grass33</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Chénopode15</div> <div>Gaillet95</div> <div>Vulpin87</div> <div>Matricaire32</div> <div>Ray-grass69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode-4</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Vulpin-4</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Ray-grass-4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d3</div> <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode-5</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin-6</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Ray-grass-11</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	Densité de semis 260 gr/m² <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Vulpin-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Ray-grass-2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode-1</div> <div>Gaillet-1</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Ray-grass-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Vulpin0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d1</div> <div>Oct-d2</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode3</div> <div>Gaillet88</div> <div>Vulpin74</div> <div>Matricaire21</div> <div>Ray-grass51</div>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Chénopode	37
Gaillet	18
Vulpin	24
Matricaire	42
Ray-grass	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode	-10
Gaillet	-10
Vulpin	-10
Matricaire	-10
Ray-grass	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Date de labour

Jan-d2

Chénopode	-1
Gaillet	-3
Vulpin	-2
Matricaire	-1
Ray-grass	-2

Densité de semis

260 gr/m²

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Entre rangs

12.5 cm

Chénopode	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode	-1
Gaillet	-1
Vulpin	-1
Matricaire	-1
Ray-grass	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Avr-d2

Mar-d1

Score annuel

Chénopode	23
Gaillet	2
Vulpin	9
Matricaire	28
Ray-grass	6