

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SARL Ferme de Brunehaut Pré
La ferme du Bois
Limoneux

Commentaires :

PARCELLE TEST COURS AGRO LASALLE

TEST SUR TCS PAS D'INTERCULTURE

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 38 | |
| Ray-grass | 38 | |
| Matricaire | 33 | |
| Brome mou | 44 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 40 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Brome mou 105 | Brome mou -6 | Brome mou -3 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Sep-d1 | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 79 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 84 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 20 |
| Brome mou -2 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Brome mou 95 |

Année 2 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin60</div> <div>Ray-grass52</div> <div>Matricaire29</div> <div>Brome mou71</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin-4</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Brome mou-4</div> | Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-11</div> <div>Ray-grass-13</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Brome mou-11</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Brome mou0</div> | Densité de semis 260 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Brome mou0</div> |
| Entre rangs 13 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Brome mou-2</div> | Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Brome mou-1</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Brome mou0</div> | Désherbage chimique <div>Nov-d3</div> <div>Oct-d2</div> | Score annuel <div>Vulpin42</div> <div>Ray-grass32</div> <div>Matricaire18</div> <div>Brome mou53</div> |

Année 3 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin14</div> <div>Ray-grass18</div> <div>Matricaire23</div> <div>Brome mou21</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin-4</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Brome mou-4</div> | Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-12</div> <div>Ray-grass-14</div> <div>Matricaire-4</div> <div>Brome mou-12</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Brome mou0</div> | Densité de semis 270 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Brome mou0</div> |
| Entre rangs 13 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Brome mou-2</div> | Variété Très couvrante <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Brome mou-2</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Brome mou0</div> | Désherbage chimique <div>Déc-d3</div> <div>Nov-d1</div> | Score annuel <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Matricaire11</div> <div>Brome mou1</div> |

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 83 |
| Ray-grass | 66 |
| Matricaire | 26 |
| Brome mou | 92 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

| | |
|------------|-----|
| Vulpin | -10 |
| Ray-grass | -10 |
| Matricaire | -10 |
| Brome mou | -10 |

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d2 Jul-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -1 |
| Ray-grass | -4 |
| Matricaire | -3 |
| Brome mou | -3 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Brome mou | 0 |

Densité de semis

260 gr/m²

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Brome mou | 0 |

Entre rangs

13 cm

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Brome mou | -2 |

Variété

Moyennement couvrante

| | |
|------------|----|
| Vulpin | -1 |
| Ray-grass | -1 |
| Matricaire | -1 |
| Brome mou | -1 |

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

| | |
|------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Brome mou | 0 |

Désherbage chimique

Déc-d1

Oct-d1

Score annuel

| | |
|------------|----|
| Vulpin | 69 |
| Ray-grass | 49 |
| Matricaire | 10 |
| Brome mou | 76 |