

Exploitation : EARL Demeter
 Parcelle : La motte 2
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	22
Chénopode	62
Vulpin	33
Matricaire	76
Ray-grass	33

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d1	4.5 gr/m ²
Agrostis 9 Chénopode 66 Vulpin 35 Matricaire 47 Ray-grass 33	Agrostis 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Chénopode -2 Vulpin -3 Matricaire -1 Ray-grass -4	Agrostis -5 Chénopode -2 Vulpin -9 Matricaire -2 Ray-grass -6	Agrostis 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Agrostis 4 Chénopode 62 Vulpin 24 Matricaire 44 Ray-grass 22
Agrostis 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d2 Nov-d3	Agrostis 30 Chénopode 5 Vulpin 54 Matricaire 23 Ray-grass 46
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	70 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Agrostis 17 Chénopode 63 Vulpin 36 Matricaire 47 Ray-grass 31
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Fév-d2	Agrostis 16 Chénopode 0 Vulpin 41 Matricaire 9 Ray-grass 32
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	12 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d2 Mar-d3	Agrostis 11 Chénopode 60 Vulpin 27 Matricaire 45 Ray-grass 24
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Fév-d2	Agrostis 30 Chénopode 5 Vulpin 54 Matricaire 23 Ray-grass 46
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		