

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Test
Test
Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Chénopode | 55 | |
| Vulpin | 9 | |
| Ray-grass | 11 | |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Août-d3 | Nov-d1 | 300 gr/m² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Date de semis du couvert : Non définie | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Date de destruction : Non définie | Vulpin -3 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Chénopode -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 |
| | | Vulpin -3 | | |
| | | Ray-grass -4 | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 | Chénopode 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Vulpin 3 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 6 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d2

Chénopode 63

Vulpin 21

Ray-grass 19

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Date de labour

Nov-d3

Chénopode -1

Vulpin -2

Ray-grass -2

Densité de semis

33 gr/m²

Chénopode 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Entre rangs

75 cm

Chénopode 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Mai-d2

Avr-d3

Score annuel

Chénopode 62

Vulpin 19

Ray-grass 18