

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Morepas  
Chemin vert  
Limon profond

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	11	
Ray-grass	13	
Chénopode	54	
Folle-avoine	28	

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 66
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 69

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d3 Vulpin 4 Ray-grass 4 Chénopode 6 Folle-avoine 13	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Folle-avoine -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Ray-grass -2 Chénopode 0 Folle-avoine -0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 20 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3 Jun-d1 Mai-d2 Avr-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 2 Folle-avoine 8

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35 Ray-grass 35 Chénopode 8 Folle-avoine 20	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Folle-avoine -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -15 Ray-grass -13 Chénopode -3 Folle-avoine -4	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 20 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3 Mai-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 16 Ray-grass 18 Chénopode 1 Folle-avoine 12

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Folle-avoine 69</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	11 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Jul-d3 Jun-d3 Jun-d2</div> <div>Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1</div>	<div>Vulpin 28</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Folle-avoine 69</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d3</div> <div>Vulpin 4</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Folle-avoine 13</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -2</div>	300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Déc-d2 Mai-d3 Mai-d1</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Folle-avoine 7</div>