

Exploitation : FDM  
 Parcelle : Montagnette  
 Type de sol : argileux silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	28
Ray-grass	34
Laiteron rude	36

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d2 Jan-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1 Vulpin -1 Ray-grass -0 Laiteron rude -1	Pas de labour	11 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1 Laiteron rude -6	Mar-d1	Vulpin 36 Ray-grass 33 Laiteron rude 32
Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Oct-d2	Oct-d2	Vulpin 50 Ray-grass 43 Laiteron rude 23
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -1		

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2	Pas de labour	700 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -2 Ray-grass -2 Laiteron rude -2	Mai-d2 Jul-d1 Mar-d2	Vulpin 29 Ray-grass 26 Laiteron rude 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Nov-d1 Oct-d2	Vulpin 49 Ray-grass 43 Laiteron rude 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 14 Ray-grass 11 Laiteron rude 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 43	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 73	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 18	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Oct-d2 Sep-d2	Oct-d2	Vulpin 28 Ray-grass 59 Laiteron rude 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		