

Exploitation : FDB
 Parcelle : La Grande
 Type de sol : Limon Profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21
Vulpin	22

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	700 gr/m ²	
Ray-grass 12	Ray-grass -6 Vulpin -6	Ray-grass -4 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	
Vulpin 15					
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Mai-d1	Ray-grass 2 Vulpin 8	
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0				
Vulpin 0					

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²	
Ray-grass 52	Ray-grass -6 Vulpin -6	Ray-grass -5 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	
Vulpin 60					
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Fév-d3 Fév-d1	Oct-d2	Ray-grass 38 Vulpin 49	
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass -2 Vulpin -3			
Vulpin 0					

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	110 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Mai-d3	Ray-grass 3 Vulpin 8
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Fév-d2	Nov-d1	Ray-grass 18 Vulpin 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	80 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Avr-d2 Mar-d3	Ray-grass 28 Vulpin 31
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 6 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Fév-d3	Oct-d3	Ray-grass 44
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 54
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	114 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0	Mai-d3 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d1	Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin -1		Vulpin 36
Vulpin 0	Vulpin 0			

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	110 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 16 Vulpin 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 9 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3 Mar-d2	Oct-d3	Ray-grass 45 Vulpin 55
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		