

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL de Jules
Julienne - test J2 - lin
Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Vulpin	17	
Chénopode	60	

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Avr-d1 Ray-grass 27 Vulpin 28 Chénopode 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1 Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 35 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 21 Vulpin 22 Chénopode 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	11 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 24
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 55

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	215 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 5
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		