

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC du Pont Neuf
2
Argile à cailloux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	34	
Vulpin	0	
Renouée liseron	22	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Sep-d3 Chénopode -3 Vulpin -16 Renouée liseron -6	Densité de semis 40 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 18 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Chénopode -1 Vulpin -1 Renouée liseron 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis

Jun-d1

Chénopode 43

Vulpin 4

Renouée liseron
63

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Date de labour

Nov-d2

Chénopode -2

Vulpin -10

Renouée liseron
-6

Densité de semis

13 gr/m²

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron
0

Entre rangs

65 cm

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron
0

Variété

Très couvrante

Chénopode -2

Vulpin -2

Renouée liseron -2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d2

Mai-d1

Chénopode 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 39

Vulpin 0

Renouée liseron
55