

Exploitation :

A. Smessaert

Parcelle :

Les Meules (maïs)

Type de sol :

argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16
Vulpin	16

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Aoû-d1 Jul-d3 Date de sémis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d3	Non défini
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin 0		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	165 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 42 Vulpin 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Nov-d3	Non défini
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 26 Vulpin 29
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	215 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 7 Vulpin 8	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -1 Vulpin -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 1 Vulpin 1
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Avr-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Avr-d2 Ray-grass -4 Vulpin -5	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Ray-grass 12 Vulpin 15	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Mai-d3	Ray-grass 2 Vulpin 6
Ray-grass -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		