

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC
Couesmé
Argilo-Calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29	
Chénopode	43	
Vulpin	32	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d2"/> Ray-grass 52 Chénopode 11 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : <input type="text" value="Sep-d2"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass -5 Chénopode -2 Vulpin -5	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 20 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique <input type="text" value="Oct-d3"/>	Score annuel Ray-grass 36 Chénopode 0 Vulpin 44

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Vulpin 56</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Vulpin -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> <div>Aoû-d2</div> <div>Jul-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 275 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 20 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 29</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 39</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 71</div> <div>Vulpin 28</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> <div>Jun-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 9 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 60 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Vulpin 26</div>