

Exploitation : scea du moulin vert
Parcelle : ilot telepac 911
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Ray-grass | 28 | |
| Vulpin | 27 | |
| Chénopode | 69 | |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Chénopode 63 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 | Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 | Date de labour Jan-d1 Ray-grass -3 Vulpin -4 Chénopode -1 | Densité de semis 98 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 12 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 | Variété Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 | Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d2 | Score annuel Ray-grass 14 Vulpin 15 Chénopode 59 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Non définie | Pas de labour | 180 gr/m² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Date de semis du couvert : Jul-d2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Date de destruction : Sep-d3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Ray-grass 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| | | Vulpin 0 | | |
| | | Chénopode 0 | | |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Non définie | Oct-d2 Nov-d2 | Ray-grass 46 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Houe rotative : Non définie | | Vulpin 54 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Herse étrille : Non définie | | Chénopode 5 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Ray-grass 0 | | |
| | | Vulpin 0 | | |
| | | Chénopode 0 | | |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Non définie | Jan-d1 | 12 gr/m² |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Date de semis du couvert : Aoû-d3 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Date de destruction : Jan-d1 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Ray-grass 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| | | Vulpin 0 | | |
| | | Chénopode 0 | | |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Non définie | Mai-d1 Jun-d2 Avr-d3 | Ray-grass 24 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Houe rotative : Non définie | Avr-d2 | Vulpin 24 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Herse étrille : Non définie | | Chénopode 64 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Ray-grass 0 | | |
| | | Vulpin 0 | | |
| | | Chénopode 0 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|----------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 180 gr/m² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------|---------------|--|---------------------|--------------|
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie | Nov-d2 Oct-d2 | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 46 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 54 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 5 |

Année 5 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------|------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Jan-d1 | Jan-d1 | 4 gr/m² |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|---------------|--|---------------------|--------------|
| 90 cm | Non couvrante | Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie | Avr-d3 Mai-d3 | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 16 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 17 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 61 |