

Exploitation : Du Ringeat
 Parcelle : Bois saint Louis
 Type de sol : Sec, silex, moyennement bonne terre

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	22
Vulpin	30
Ray-grass	27

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d2	Oct-d1	10 gr/m ²	
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0	
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0	
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -12	Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2	Folle-avoine 18	
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Vulpin 0	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 0	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	400 gr/m ²
Folle-avoine 34	Folle-avoine -6	Date de destruction : Non définie	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Vulpin 87	Vulpin -6		Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 69	Ray-grass -6		Ray-grass 0	Ray-grass -2
Entre rangs				
25 cm	Très couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Nov-d1 Avr-d2 Mar-d2	Folle-avoine 24
Vulpin 0	Vulpin -2	Folle-avoine 0	Vulpin 0	Vulpin 77
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 59