

Exploitation : Pierrejeux
Parcelle : Jardin
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|---------------|----------|--|
| Laiteron rude | 28 | |
| Brome mou | 50 | |
| Chénopode | 0 | |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Laiteron rude 29</p> <p>Brome mou 71</p> <p>Chénopode 11</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Laiteron rude -10</p> <p>Brome mou -10</p> <p>Chénopode -10</p> | <p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Densité de semis</p> <p>200 gr/m²</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>20 cm</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Variété</p> <p>Très couvrante</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Non définie</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Désherbage chimique</p> <p>Oct-d3</p> | <p>Score annuel</p> <p>Laiteron rude 17</p> <p>Brome mou 59</p> <p>Chénopode 0</p> |