

Exploitation : EARL FERME EGREVILLE  
 Parcelle : Justice 2  
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26
Laiteron rude	40
Renouée liseron	26

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Avr-d1 Date de destruction : Sep-d1	Sep-d1	330 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52 Laiteron rude 29 Renouée liseron 1	Ray-grass -4 Laiteron rude -4 Renouée liseron -4	Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -3 Laiteron rude -1 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm Ray-grass -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -2	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Laiteron rude -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Fév-d2 Jan-d3 Houe rotative : Déc-d2 Nov-d2 Herse étrille : Nov-d3		Ray-grass 41 Laiteron rude 17 Renouée liseron 0
		Ray-grass -1 Laiteron rude -4 Renouée liseron 0		

## Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Jan-d3	330 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35 Laiteron rude 38 Renouée liseron 58	Ray-grass -10 Laiteron rude -10 Renouée liseron -10	Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -2 Laiteron rude -1 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Avr-d3 Avr-d2		Ray-grass 16 Laiteron rude 18 Renouée liseron 32
Ray-grass -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -2	Ray-grass -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -2	Ray-grass -3 Laiteron rude -5 Renouée liseron -11		

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33 Laiteron rude 46 Renouée liseron 85	Ray-grass -4 Laiteron rude -4 Renouée liseron -4	Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -2 Laiteron rude -1 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Ray-grass -2 Laiteron rude -6 Renouée liseron -13		Ray-grass 24 Laiteron rude 33 Renouée liseron 64
Ray-grass 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -2			