

Exploitation : SCEA des Faucons  
 Parcelle : Plateforme  
 Type de sol : Limon

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27

## Système de culture

### Situation initiale :

Année 1 - Maïs				
Date de semis  Avr-d3  Ray-grass 12	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -5	Date de labour  Nov-d1  Ray-grass -2	Densité de semis  9 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  75 cm  Ray-grass 0	Variété  Très couvrante  Ray-grass -2	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Avr-d3 Mai-d3  Ray-grass 3	Score annuel  Ray-grass 3
Année 2 - Blé d'hiver				
Date de semis  Oct-d3  Ray-grass 35	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6	Interculture  Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -3	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Nov-d1 Nov-d3  Ray-grass 23	Score annuel  Ray-grass 23

### Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Ray-grass 4	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Oct-d3 Ray-grass -8	Pas de labour Ray-grass 0	110 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Ray-grass 0

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d2 Ray-grass 0	Pas de labour Ray-grass 0	240 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 62

### Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96	Association de cultures : Féverole d'hiver Moyen Ray-grass -6	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Pas de labour Ray-grass 0	40 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d2 Déc-d3	Score annuel Ray-grass 87

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -9	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 220 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3 Nov-d2	Score annuel Ray-grass 18