

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 5,5 ha
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	23
Renouée liseron	36
Chénopode	49

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Nov-d1 Amarante réfléchie : 0 Renouée liseron : 0 Chénopode : 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Amarante réfléchie : -10 Renouée liseron : -10 Chénopode : -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Amarante réfléchie : 0 Renouée liseron : 0 Chénopode : 0	Date de labour Nov-d1 Amarante réfléchie : -2 Renouée liseron : -3 Chénopode : -1	Densité de semis 300 gr/m² Amarante réfléchie : 0 Renouée liseron : 0 Chénopode : 0
Entre rangs 12.5 cm Amarante réfléchie : -2 Renouée liseron : -2 Chénopode : -2	Variété Très couvrante Amarante réfléchie : -2 Renouée liseron : -2 Chénopode : -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie : 0 Renouée liseron : 0 Chénopode : 0	Désherbage chimique Fév-d2	Score annuel Amarante réfléchie : 0 Renouée liseron : 0 Chénopode : 0

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Amarante réfléchie 30</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 31</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Août-d3</p> <p>Amarante réfléchie -3</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>200 gr/m²</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Amarante réfléchie -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Amarante réfléchie 26</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 28</p>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Amarante réfléchie 52</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Chénopode 62</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d3 Date de semis du couvert : Oct-d3</p> <p>Date de destruction : Fév-d3</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Avr-d2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Renouée liseron -5</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>85 cm</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Amarante réfléchie -5</p> <p>Renouée liseron -5</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Avr-d3 Mai-d2</p>	<p>Amarante réfléchie 43</p> <p>Renouée liseron 125</p> <p>Chénopode 55</p>