

Exploitation : GAEC du moulin rouge  
 Parcelle : quesnoy  
 Type de sol : Néoluviosol

### Commentaires :

Rotation sur 2 ans

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	74
Agrostis	18
Chénopode	61

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	Non défini
Matricaire 29 Agrostis 36 Chénopode 11	Matricaire -4 Agrostis -4 Chénopode -4	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1	Jun-d2 Mai-d2 Avr-d2 Nov-d2	Matricaire 23 Agrostis 29 Chénopode 5
Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -2 Agrostis -2 Chénopode -2		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Nov-d2</b>	Non défini
Matricaire 49 Agrostis 4 Chénopode 71	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -2 Agrostis -5 Chénopode -2	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : <b>Avr-d2</b> Herse étrille : <b>Jul-d1</b>		Matricaire 45 Agrostis 0 Chénopode 65
Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -2 Agrostis -0 Chénopode -3		