

Exploitation : GAEC du moulin rouge
 Parcelle : quesnoy
 Type de sol : Néoluviosol

Commentaires :

Rotation sur 2 ans

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	72
Agrostis	17
Chénopode	59

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <i>Aoû-d3</i> Date de destruction : <i>Sep-d3</i>	Pas de labour	Non défini
Matricaire 29 Agrostis 36 Chénopode 11	Matricaire -4 Agrostis -4 Chénopode -4	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <i>Mar-d3</i> <i>Mar-d1</i>	Nov-d2 <i>Avr-d2</i> <i>Mai-d2</i> <i>Jun-d2</i>	Matricaire 21 Agrostis 28 Chénopode 2
Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -5 Agrostis -3 Chénopode -5		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	Non défini
Matricaire 49 Agrostis 4 Chénopode 71	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -2 Agrostis -5 Chénopode -2	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Jul-d3 Jul-d1		Matricaire 45 Agrostis 0 Chénopode 65
Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Chénopode 0	Matricaire -2 Agrostis -0 Chénopode -3		