



Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Démonstration
Parcelle : CA60
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Ceci est une parcelle de test

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Ray-grass | 34 (45)  |
| Chénopode | 35 (41)  |

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Betteraves

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Date de semis Avr-d1 Ray-grass 27 Chénopode 66 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Chénopode 0 | Date de labour Déc-d1 Ray-grass -3 Chénopode -1 | Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode -2 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 14 Chénopode 53 |

Année 2 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Chénopode 8 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Chénopode 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 | Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 29 Chénopode 2 |

Année 3 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Chénopode 31 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 | Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -1 Chénopode -2 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 | Densité de semis 45 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 88 Chénopode 21 |

Année 4 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 Chénopode 15 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4 | Interculture Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2 Chénopode -2 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 | Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Chénopode -1 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 62 Chénopode 9 |

Année 5 - Aucune

Date de semis

Jan-d1

Ray-grass 1

Chénopode 4

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass 0

Chénopode 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Jan-d1

Date de destruction :

Jan-d1

Ray-grass 0

Chénopode 0

Date de labour

Jan-d1

Ray-grass -3

Chénopode -1

Densité de semis

gr/m²

Ray-grass 0

Chénopode 0

Entre rangs

cm

Ray-grass 0

Chénopode 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Chénopode 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 0

Chénopode 3