

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Legoulet
Voie ds Baconnes
Blanc

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18	
Vulpin	17	
Brome stérile	8	
Carotte sauvage	85	
Agrostis	1	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Brome stérile 11</p> <p>Carotte sauvage 58</p> <p>Agrostis 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Oct-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>1000 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Agrostis 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Agrostis -1</p>	<p>Bineuse : Jun-d2 Mai-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Carotte sauvage -8</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Avr-d3 Avr-d1</p>	<p>Ray-grass 17</p> <p>Vulpin 19</p> <p>Brome stérile 10</p> <p>Carotte sauvage 49</p> <p>Agrostis 0</p>

