

Exploitation : EARL Grand Boixière  
 Parcelle : les messières  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21
Matricaire	58
Folleavoine	23

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Nov-d2  Ray-grass 7 Matricaire 21 Folle-avoine 13	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4 Matricaire -4 Folle-avoine -4	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Date de labour  Oct-d2  Ray-grass -3 Matricaire -1 Folle-avoine -2	Densité de semis  300 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0
Entre rangs  17 cm  Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1 Matricaire -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique  Oct-d3 Jan-d1	Score annuel  Ray-grass 0 Matricaire 15 Folle-avoine 6

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Avr-d3	Mai-d1	10 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Matricaire 37	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d3	Ray-grass 0 Matricaire 34 Folle-avoine 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d3	330 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Matricaire 47	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Avr-d3	Ray-grass 20 Matricaire 36 Folle-avoine 67
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Ray-grass 97 Matricaire 30 Folle-avoine 32	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Ray-grass -10 Matricaire -10 Folle-avoine -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Aoû-d3 Ray-grass -3 Matricaire -1 Folle-avoine -2	30 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Matricaire -2 Folle-avoine -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 83 Matricaire 17 Folle-avoine 18