

Exploitation : EARL de l'Epinoy
Parcelle : Longogne
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	34	
Chénopode	40	
Vulpin	35	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d1"/> Ray-grass 69 Chénopode 15 Vulpin 87	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour <input type="text" value="Août-d3"/> Ray-grass -11 Chénopode -4 Vulpin -12	Densité de semis 260 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Oct-d2"/>	Score annuel Ray-grass 52 Chénopode 6 Vulpin 69

Année 2 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Vulpin 38</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Août-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -9</div>	Densité de semis 14 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 50 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d1</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 25</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Vulpin 26</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Variété Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d1</div> <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 27</div>