

Scénario : scénario avec suppression PDT  
Exploitation : GAVE ALAIN  
Parcelle : Le cerisier  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	23 ( 20 )	
Ray-grass	22 ( 20 )	
Gaillet	13 ( 9 )	
Chénopode	75 ( 79 )	

## Système de culture

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -2	Gaillet -4	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6

## Année 2 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Chénopode 64</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Mar-d2</div> <div>Août-d2</div> <div>Août-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 32</div> <div>Ray-grass 28</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Chénopode 60</div>

## Année 3 - Lin d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Chénopode 66</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Mar-d2</div> <div>Août-d2</div> <div>Août-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 29</div> <div>Ray-grass 26</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 62</div>

## Année 4 - Maïs

### Date de semis

Mai-d1

Vulpin	9
Ray-grass	6
Gaillet	0
Chénopode	57

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0

### Interculture

Date des faux semis :

Avr-d3    Août-d2  
Août-d3

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-3
Ray-grass	-5
Gaillet	-0
Chénopode	-4

### Date de labour

Nov-d2

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-4
Chénopode	-1

### Densité de semis

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0

### Entre rangs

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	3
Ray-grass	0
Gaillet	0
Chénopode	53