

Exploitation : SCEA DE SOUY
Parcelle : 8,11 ha
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	54	
Folle-avoine	13	
Ray-grass	59	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1 Jan-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 87
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 15
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 65

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Ray-grass 88</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Ray-grass -10</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d1 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>38 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Sep-d1 Oct-d2</p>	<p>Vulpin 55</p> <p>Folle-avoine 9</p> <p>Ray-grass 75</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Folle-avoine 26</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Oct-d2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p>Oct-d2</p> <p>Vulpin -8</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>280 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Fév-d2 Jan-d1</p>	<p>Vulpin 44</p> <p>Folle-avoine 14</p> <p>Ray-grass 38</p>