

Exploitation : GAEC Bacou
Parcelle : coteau tiffaut
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	1 
Folle-avoine	5 
Ray-grass	2 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Déc-d1</p> <p>Vulpin 6</p> <p>Folle-avoine 13</p> <p>Ray-grass 4</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Jul-d1</p> <p>Date de destruction : Oct-d1</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>250 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>20 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 1</p> <p>Folle-avoine 8</p> <p>Ray-grass 0</p>

Année 2 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	23 gr/m ²
Vulpin 9	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 14	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 1	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Avr-d1	
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 2
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	245 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 3
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 4
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 7