

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL de La Croix Dans
Pierre le Vigier
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	61	
Matricaire	73	
Renouée liseron	48	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66 Matricaire 45 Renouée liseron 108	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Date de labour Mar-d2 Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -2	Densité de semis 11 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Jun-d2 Mar-d3 Avr-d2 Mai-d1 Mai-d3	Score annuel Chénopode 63 Matricaire 42 Renouée liseron 105

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	200 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 7
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 26
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	220 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 7
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 26
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis

Avr-d2

Chénopode 63

Matricaire 42

Renouée liseron
127

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Matricaire 0

Renouée liseron 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Sep-d2

Date de destruction :

Fév-d2

Chénopode 0

Matricaire 0

Renouée liseron 0

Date de labour

Mar-d2

Chénopode -1

Matricaire -1

Renouée liseron
-2

Densité de semis

2100 gr/m²

Chénopode 0

Matricaire 0

Renouée liseron
0

Entre rangs

12 cm

Chénopode 0

Matricaire 0

Renouée liseron
0

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Matricaire -1

Renouée liseron -1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode 0

Matricaire 0

Renouée liseron 0

Désherbage chimique

Avr-d3

Mai-d1

Score annuel

Chénopode 61

Matricaire 40

Renouée liseron
124