

Exploitation : GAEC les coteaux d'hugier
 Parcelle : sous le bois de bay
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	26
Matricaire	51
Renouée liseron	6

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d1</div> Folle-avoine 93 Matricaire 48 Renouée liseron 35	Association de cultures : Avoine de printemps Fort Folle-avoine -10 Matricaire -10 Renouée liseron -10	Date des faux semis : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d1</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jul-d1</div> Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jan-d1</div> Folle-avoine -3 Matricaire -1 Renouée liseron -3	300 gr/m ² Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Houe rotative : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Herse étrille : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div>	Folle-avoine 79 Matricaire 36 Renouée liseron 21	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	200 gr/m ²
Folle-avoine 26 Matricaire 29 Renouée liseron 1	Folle-avoine -4 Matricaire -4 Renouée liseron -4	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Renouée liseron -3	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		Folle-avoine 16 Matricaire 22 Renouée liseron 0
Folle-avoine -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1	Folle-avoine -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1			

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Pois de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	220 gr/m ²
Folle-avoine 7 Matricaire 20 Renouée liseron 0	Folle-avoine -10 Matricaire -10 Renouée liseron -10	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Renouée liseron -3	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0		Folle-avoine 0 Matricaire 7 Renouée liseron 0
Folle-avoine -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1	Folle-avoine -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1			