

Exploitation : LECLERC
Parcelle : colbert
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	49	
Vulpin	20	
Ray-grass	21	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Renouée liseron : 111 Vulpin : 4 Ray-grass : 4	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Déc-d1 Renouée liseron : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Date de labour Avr-d1 Renouée liseron : -2 Vulpin : -3 Ray-grass : -2	Densité de semis 98 gr/m² Renouée liseron : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0
Entre rangs 80 cm Renouée liseron : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Variété Non couvrante Renouée liseron : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron : 0 Vulpin : 0 Ray-grass : 0	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel Renouée liseron : 109 Vulpin : 1 Ray-grass : 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Oct-d1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>200 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12 cm</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Nov-d2</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 49</p> <p>Ray-grass 43</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Oct-d1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p>200 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12 cm</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Nov-d2</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 49</p> <p>Ray-grass 43</p>

Année 4 - Maïs

Date de semis

Mai-d1

Renouée liseron

130

Vulpin 9

Ray-grass 6

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Renouée liseron 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Déc-d3

Renouée liseron 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Date de labour

Avr-d1

Renouée liseron

-2

Vulpin -3

Ray-grass -2

Densité de semis

98 gr/m²

Renouée liseron

0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Entre rangs

80 cm

Renouée liseron

0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Renouée liseron 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Renouée liseron 0

Vulpin 0

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Mai-d3

Score annuel

Renouée liseron

128

Vulpin 6

Ray-grass 4