

Exploitation : EARL LEDIEU
Parcelle : test
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	27	
Ray-grass	31	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 180 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 53 Ray-grass 46

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Vulpin 38 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Mar-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4	Date de labour Nov-d2 Vulpin -10 Ray-grass -7	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d1	Score annuel Vulpin 24 Ray-grass 23

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Ray-grass -2	Date de labour Aoû-d2 Vulpin -10 Ray-grass -10	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 49 Ray-grass 68

Année 4 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Avr-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -4</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -7</div>	Densité de semis Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 9</div> <div>Ray-grass 8</div>

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -2</div>	Date de labour <div>Aoû-d3</div> <div>Vulpin -12</div> <div>Ray-grass -11</div>	Densité de semis Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 31</div> <div>Ray-grass 25</div>