

Exploitation : SCEA DE LA GARE  
 Parcelle : test  
 Type de sol : Limon

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin       | 18       |
| Ray-grass    | 19       |

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Date de semis<br><br>Oct-d3<br><br>Vulpin 35<br>Ray-grass 35 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br><br>Vulpin -4<br>Ray-grass -4 | Interculture<br><br>Date des faux semis :<br>Oct-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br><br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Date de labour<br><br>Aoû-d3<br><br>Vulpin -3<br>Ray-grass -3 | Densité de semis<br><br>270 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Entre rangs<br><br>17 cm<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0      | Variété<br><br>Non couvrante<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0   | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0  | Désherbage chimique   | Score annuel<br><br>Vulpin 26<br>Ray-grass 26                                |

## Année 2 - Maïs

| Date de semis                         | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour                      | Densité de semis                      |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Avr-d2                                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Avr-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Sep-d1<br>Date de destruction :<br>Non définie | Fév-d1<br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Vulpin 21<br>Ray-grass 19             | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                            | Vulpin -3<br>Ray-grass -4  |                                     |                                       |
| Entre rangs                           | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                 | Score annuel                          |
| Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Non couvrante<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0           | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |                                     | Vulpin 16<br>Ray-grass 14             |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis                    | Étouffement culture                         | Interculture   | Date de labour                      | Densité de semis                      |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Oct-d3                           | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Oct-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Aoû-d3<br>Vulpin -3<br>Ray-grass -3 | Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Vulpin 31<br>Ray-grass 31        | Vulpin -10<br>Ray-grass -10                 | Vulpin -2<br>Ray-grass -2  |                                     |                                       |
| Entre rangs                      | Variété                                     | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                 | Score annuel                          |
| 17 cm<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Non couvrante<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |                                     | Vulpin 16<br>Ray-grass 16             |

#### Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis                         | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour                      | Densité de semis                      |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Avr-d1                                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Avr-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Sep-d1<br>Date de destruction :<br>Non définie | Fév-d1<br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Vulpin 28<br>Ray-grass 27             | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                            | Vulpin -3<br>Ray-grass -4  |                                     |                                       |
| Entre rangs                           | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                 | Score annuel                          |
| Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Non couvrante<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0           | Bineuse :<br>Mai-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin -1<br>Ray-grass -1                                 |                                     | Vulpin 22<br>Ray-grass 21             |

#### Année 5 - Betteraves

| Date de semis                         | Étouffement culture                                | Interculture  | Date de labour                      | Densité de semis                      |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Mar-d2                                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Mar-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Sep-d1<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Vulpin -3<br>Ray-grass -4 | Fév-d1<br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Vulpin 38<br>Ray-grass 35             | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                            |   |                                     |                                       |
| Entre rangs                           | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique                 | Score annuel                          |
| Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Non couvrante<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0           | Bineuse :<br>Mai-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin -1<br>Ray-grass -1  | Jun-d1 Avr-d1                       | Vulpin 31<br>Ray-grass 29             |

## Année 6 - Pomme de terre

| Date de semis                         | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour                      | Densité de semis                      |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Avr-d2                                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Avr-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Sep-d1<br>Date de destruction :<br>Non définie | Fév-d1<br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Vulpin 21<br>Ray-grass 19             | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                            | Vulpin -3<br>Ray-grass -4  |                                     |                                       |
| Entre rangs                           | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                 | Score annuel                          |
| Non défini<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Non couvrante<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0           | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |                                     | Vulpin 16<br>Ray-grass 14             |