

Exploitation :

GAEC DE CANTRAINE

Parcelle :

test


Type de sol :

Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	46
Chénopode	51



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux 0 Chénopode -1	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Densité de semis 220 gr/m ² Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs 14.5 cm Renouée des oiseaux -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Renouée des oiseaux 4 Chénopode 5

Année 2 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Renouée des oiseaux : 112 Chénopode : 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d2 Renouée des oiseaux : -7 Chénopode : -5	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Densité de semis 10.8 gr/m ² Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0
Entre rangs 75 cm Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Variété Non couvrante Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux : 105 Chénopode : 63
Entre rangs 14.5 cm Renouée des oiseaux : -2 Chénopode : -2	Variété Moyennement couvrante Renouée des oiseaux : -1 Chénopode : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 16

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Renouée des oiseaux : -6 Chénopode : -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : -2	Date de labour Pas de labour Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Densité de semis 40 gr/m ² Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0
Entre rangs 14.5 cm Renouée des oiseaux : -2 Chénopode : -2	Variété Moyennement couvrante Renouée des oiseaux : -1 Chénopode : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 16
Entre rangs 14.5 cm Renouée des oiseaux : -2 Chénopode : -2	Variété Moyennement couvrante Renouée des oiseaux : -1 Chénopode : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 0	Désherbage chimique 	Score annuel Renouée des oiseaux : 0 Chénopode : 16