

Exploitation :

Scénario 1 - a

Parcelle :

Wheat - Poppy

Type de sol :

Argileux

Commentaires :

Groupe : blé et Coquelicot


Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver



Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Fév-d2	Pas de labour	20 gr/m ²
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Coquelicot 0 Coquelicot 0		Coquelicot 46 Coquelicot 46
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot 0 Coquelicot 0	Sep-d1	250 gr/m ²
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Nov-d1 Coquelicot -5 Coquelicot -5		Coquelicot 51 Coquelicot 51
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		