

Exploitation :

Scénario 3 - a

Parcelle :

Sugar Beet - Chenopodium

Type de sol :

Argileux

**Commentaires :**

Groupe : Betterave/orge/ble et chénopode

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	33

## Système de culture

**Situation initiale :**

Année 1 - Epinard				
Date de semis Nov-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Oct-d3	Densité de semis 15 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0
Entre rangs 20 cm	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Année 2 - Betteraves				
Date de semis Avr-d2	Étouffement culture Association de cultures : Haricot Fort Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Avr-d1	Densité de semis 11 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0
Entre rangs 20 cm	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0

### Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis  Nov-d1  Chénopode 0	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Fort  Chénopode -10	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode 0	Date de labour  Oct-d3  Chénopode -1	Densité de semis  350 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0
Entre rangs  20 cm  Chénopode 0	Variété  Non couvrante  Chénopode 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 0