

Exploitation : EARL DES CORTILLERS
 Parcelle : BUSIGNY HAUT
 Type de sol : Limon argileux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	36



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves				
Date de semis Mar-d2 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3	Date de labour Nov-d2 Chénopode -1	Densité de semis 110 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -9	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1	Score annuel Chénopode 51

Année 2 - Blé d'hiver				
Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Oct-d2 Chénopode -1	Densité de semis 240 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 5

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 6	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode -3	Date de labour Nov-d1 Chénopode -1	Densité de semis 300 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0