

Exploitation : EARL BRIATTE
 Parcelle : test
 Type de sol : argilo limoneu

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Chénopode | 51 |

Système de culture

Situation initiale :

| Année 1 - Maïs | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Date de semis Avr-d2 Chénopode 68 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Oct-d3 Chénopode 0 | Date de labour Déc-d1 Chénopode -1 | Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 |
| Entre rangs 75 cm Chénopode 0 | Variété Non couvrante Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 67 |

| Année 2 - Blé d'hiver | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 | Date de labour Pas de labour Chénopode 0 | Densité de semis 260 gr/m ² Chénopode 0 |
| Entre rangs 17 cm Chénopode 0 | Variété Non couvrante Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 7 |

Année 3 - Pois d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Date de semis Oct-d1 Chénopode 9 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 | Date de labour Pas de labour Chénopode 0 | Densité de semis Non défini Chénopode 0 |
| Entre rangs 17 cm Chénopode 0 | Variété Non couvrante Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 9 |