

Exploitation : juju
 Parcelle : 1
 Type de sol : limon argileux sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50
Panic pied-de-coq	14
Sétaire verte	16

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d2	Mar-d3	11 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 52	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille :		Panic pied-de-coq 40
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Chénopode -2		Sétaire verte 40
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Panic pied-de-coq -3		
		Sétaire verte -3		


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -6 Panic pied-de-coq -6 Sétaire verte -6	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0
Panic pied-de-coq 0				
Sétaire verte 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Oct-d3	Déc-d1 Oct-d3 Jun-d1	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0
Chénopode -2	Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1 Sétaire verte -1	Chénopode -0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0		
Panic pied-de-coq -2				
Sétaire verte -2				


Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d2	Mar-d3	11 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4 Sétaire verte -4	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Chénopode -5 Panic pied-de-coq -5 Sétaire verte -4	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0
Panic pied-de-coq 52				
Sétaire verte 52				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Panic pied-de-coq -3 Sétaire verte -3	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 51 Panic pied-de-coq 40 Sétaire verte 40
Chénopode 0	Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0			
Panic pied-de-coq 0				
Sétaire verte 0				

Année 4 - Orge d'hiver



Année 5 - Pois de printemps



Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Chénopode 8 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4 Sétaire verte -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Pas de labour Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	250 gr/m ² Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Chénopode -2 Panic pied-de-coq -2 Sétaire verte -2	Moyennement couvrante Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1 Sétaire verte -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Oct-d3 Chénopode -0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	Déc-d1 Oct-d3 Jul-d1 Chénopode 1 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0	