

Exploitation :

Domaine de Sandricourt

Parcelle :

Le Château d'eau

Type de sol :

Brunisol (Limon intermédiaire)

Commentaires :

  


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mouron	45	
Panic pied-de-coq	11	
Ray-grass	35	

## Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d3</p> <p>Mouron 9</p> <p>Panic pied-de-coq 30</p> <p>Ray-grass 96</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Mouron -6</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Mouron -1</p> <p>Panic pied-de-coq -3</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>50 gr/m²</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>Non défini</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Mouron -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p> <p>Déc-d2 Oct-d1 Aoû-d3</p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Mouron 1</p> <p>Panic pied-de-coq 20</p> <p>Ray-grass 86</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	385 gr/m²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Oct-d1 Nov-d3 Oct-d2	Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction :	Pas de labour	384 gr/m²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2 Sep-d3	Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Ray-grass 45
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d3	7 gr/m²
Mouron 94	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Mai-d1	
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 92
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 33
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 10

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	385 gr/m²
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Sep-d3 Sep-d2 Sep-d1 Mar-d3	
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28